

令和6年度当院予防接種一覧表

令和6年6月現在

ワクチン	種類	接種可能年齢	公費負担	料金（円/回）
ロタウィルス ロタリックス or ロタテック	生	生後6週～24週未満  生後6週～32週未満	令和2年8.1～出生時	
5種混合 (4種混合+ヒブ)	不活化	生後2か月～	生後2か月～7歳半未満	
小児肺炎球菌	不活化	生後2か月～9歳以下	生後2か月～5歳未満	
B型肝炎	不活化	生後0か月～ (生後2か月～が標準)	生後0か月～1歳未満	
BCG	生	生後3か月～	生後3か月～1歳未満	
麻しん・風しん混合	生	生後1歳～	生後1歳～2歳未満：1期 年長：2期	2～5歳 11,060 6歳～ 10,240
水痘	生	生後1歳～	※未罹患に限る 生後1歳～3歳未満	3～5歳 8,700 6歳～ 7,870
おたふくかぜ	生	生後1歳～	なし	①7,220(1-5) 6,400(6-) ②4,440(1-5) 4,020(6-)
日本脳炎	不活化	(生後6か月～：半量) 生後3歳～：標準量	生後6か月～7歳半：1期、9～13歳未満：2期 ※H16.4.2～H19.4.1出生児(20歳未満で)	初回 7,160 2回目以降 4,780
2種混合(DT)	不活化	生後11歳～	生後11歳～13歳未満	5,480
子宮頸がん(HPV) シルガード9	不活化	(女児) 生後9歳～	小6～高1相当の女子 ※H9.4.2～H19.4.1出生はキャッチアップ対象 (R7.3.31まで施行)	①28,660 ②③26,290
インフルエンザ	不活化	生後6か月～：半量 生後3歳～：標準量	なし	

定期接種

任意接種

\*料金は条件によって変動あり

1歳未満で接種がのぞましい予防接種は5種類12回または13回におよびます。ロタウィルスワクチンは接種期間に制約があります。

また、肺炎球菌は開始が生後7か月をすぎると接種回数が少なくなり、十分な免疫が獲得できない可能性があります。

それぞれの予防接種には接種間隔や回数、年齢が規定されています。

さらに公費負担(定期接種)には期限があります。医学的理由(病気など)以外でこれを満たさない場合、公費負担(定期接種)

の対象とならず有料(任意接種)になることがあります。十分に理解し計画的に進めて下さい。

接種例)

ワクチン	月齢	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12ヵ月～
ロタリックス			●	●									
or ロタテック			●	●	●								
5種混合			○	○	○								○
肺炎球菌			○	○	○								○
B型肝炎			○	○				○					
BCG							●						
麻しん・風しん													●
水痘													● ●
おたふく													●

●生ワクチン ○不活化ワクチン ※BCG、麻しん・風しん、水痘、おたふくは4週間以上間隔をあけて接種

接種方法・接種間隔

令和6年6月現在

ワクチン	種類	接種方法・接種間隔	回数
ロタウイルス ロタリックス or ロタテック	生	※いずれも初回は14週6日までに開始。どちらか一種類を選択。 4週間以上あけて2回内服 ※24週までに終了 4週間以上あけて3回内服 ※32週までに終了	2 3
5種混合 (4種混合+ヒブ)	不活化	20日以上(20日~56日が標準)の間隔をおいて①・②・③、 ③から6か月以上(1年~1年半が標準)の間隔をおいて④ ※7歳半までに4回終了	4
小児肺炎球菌	不活化	2~7か月未満で開始の場合：生後24か月に至るまでに27日以上あけて①・②・③、 ③から60日以上あけ、かつ1歳以上で④ 7~11か月で開始の場合：生後24か月に至るまでに27日以上あけて①・②、 ②から60日以上あけ、かつ1歳以上で③にて終了 1歳で開始の場合：60日以上あけて①・②の2回接種にて終了 2歳以上(5歳未満)で開始：1回接種で終了	4 3 2 1
B型肝炎	不活化	①・②は4週(以上)あける①・③は20週以上あける(~24週が望ましい) ※定期は1歳未満対象	3
BCG	生	生後3か月~1歳未満で1回	1
麻しん・風しん混合	生	①1歳 ②年長	2
水痘	生	①1歳以上 ②は①から3か月以上(6か月~12か月が標準)の間隔をおいて※定期は3歳未満対象	2
おたふくかぜ	生	①1歳以上 ②は①から4~6年後	2
日本脳炎	不活化	6日以上(6日~28日が標準)の間隔をおいて①・②、 ②から6か月以上(約1年が標準)の間隔をおいて③ ※7歳半までに3回終了 ④9歳~13歳未満 ※<特例>H16.4.2~H19.4.1出生児は20歳になるまでに未接種回の接種可能	4
2種混合(DT)	不活化	11歳~13歳未満で1回	1
子宮頸がん(HPV) シルガード9 (9価ワクチン)	不活化	小6~高1相当女児。 <2回接種>15歳未満で接種開始した場合、2回接種が可能 ①・②は5か月以上あける(6か月が標準) *5か月未満で②を接種した場合は③が必要 <3回接種>15歳以上で開始した場合は3回接種 ①・②は1か月以上あける、②・③は3か月以上あける (①・②は2か月、①・③は6か月の間隔が標準) ※R7.3.31まではH9.4.2~H20.4.1に出生の女性も対象(キャッチアップ接種)	2 3
インフルエンザ	不活化	生後6か月~13歳未満は2~4週間隔で2回(生後6か月~3歳未満は半量) 13歳以上は1回、または1~4週間隔で2回	

生ワクチン 不活化ワクチン ※BCG、麻しん・風しん、水痘、おたふくは4週間以上の間隔で接種

ロタウイルスワクチンはロタウイルス胃腸炎の重症化と脳炎・脳症合併の予防。

5種混合はジフテリア、破傷風、百日咳感染の予防に加えて、ポリオウイルス感染による脊髄麻痺の予防、ヒブ(b型インフルエンザ菌)による細菌性髄膜炎の予防。肺炎球菌ワクチンは肺炎球菌による細菌性髄膜炎の予防。B型肝炎ワクチンは長期持続感染による肝硬変や肝癌の予防。

2種混合はジフテリア、破傷風の予防。

子宮頸がんワクチンはHPV(ヒトパピローマウイルス)の長期持続感染による子宮頸癌の予防の目的で接種されます。

月曜日午後13:00~16:00: BCG以外の予防接種全般

第2, 4金曜日13:00 : BCG

土曜日午後 : 麻しん・風しん2期、小学生以上の日本脳炎、2種混合(DT)

お問い合わせ・予約 広島市医師会運営・安芸市民病院 外来082-827-0121